

Aldus Libris

표본평균과 추정 기출 모음

문제만 · 교재형

10문항 · 미리보기

문제의 문장·수식·그림·선택지는 시행기관의 원문 그대로 담았어요. 문항마다 출처를 확인할 수 있고, 뒤쪽에서 공식 정답과 대조한 답을 볼 수 있어요.

목차와 웹 리더에서 시험·선택과목을 골라 공부해 보세요. 서로 다른 시험의 같은 문항 번호는 출처를 함께 확인해요.

이 책은 문제와 정답에 집중해요. 풀이가 필요하면 같은 문항을 담은 「개념과 풀이」 또는 「문제와 팁」을 이용해 보세요.

출처와 이용 안내

Aldus Libris

수록 기출문제는 각 시행기관의 저작물이며, 사용 허가를 받아 실었어요. 이 책은 Aldus Libris에서 편집했어요. 모든 미리보기와 전체 파일을 무료로 이용할 수 있어요.

이 책은 Aldus Libris의 편집물이에요. 시행기관의 로고를 사용하지 않으며, 해당 기관의 공식 발행이나 후원을 뜻하지 않아요.

수록 시험

2022학년도 대학수학능력시험 수학

2022학년도 9월 모의평가 수학

2023학년도 대학수학능력시험 수학

2024학년도 대학수학능력시험 수학

2025학년도 대학수학능력시험 수학

2025학년도 9월 모의평가 수학

2026학년도 대학수학능력시험 수학

2026학년도 9월 모의평가 수학

2022학년도 10월 고3 전국연합학력평가 수학

한국교육과정평가원 · 2022학년도 대학수학능력시험 수학 확률과 통계 27번 홀수형

27. 어느 자동차 회사에서 생산하는 전기 자동차의

1회 충전 주행 거리는 평균이 m 이고 표준편차가 σ 인
정규분포를 따른다고 한다.

이 자동차 회사에서 생산한 전기 자동차 100대를 임의추출하여
얻은 1회 충전 주행 거리의 표본평균이 $\overline{x}_1$ 일 때, 모평균 m 에
대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다.

이 자동차 회사에서 생산한 전기 자동차 400대를 임의추출하여
얻은 1회 충전 주행 거리의 표본평균이 $\overline{x}_2$ 일 때, 모평균 m 에
대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $c \leq m \leq d$ 이다.

$\overline{x}_1 - \overline{x}_2 = 1.34$ 이고 $a = c$ 일 때, $b - a$ 의 값은? (단, 주행 거리의
단위는 km이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때
 $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) [3점]

- | | | |
|---------|---------|--------|
| ① 5.88 | ② 7.84 | ③ 9.80 |
| ④ 11.76 | ⑤ 13.72 | |

한국교육과정평가원 · 2022학년도 9월 모의평가 수학 확률과 통계 27번

27. 지역 A에 살고 있는 성인들의 1인 하루 물 사용량을 확률변수 X , 지역 B에 살고 있는 성인들의 1인 하루 물 사용량을 확률변수 Y 라 하자. 두 확률변수 X, Y 는 정규분포를 따르고 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 확률변수 X, Y 의 평균은 각각 220과 240이다.
 (나) 확률변수 Y 의 표준편차는 확률변수 X 의 표준편차의 1.5배이다.

지역 A에 살고 있는 성인 중 임의추출한 n 명의 1인 하루 물 사용량의 표본평균을 $\overline{X}$, 지역 B에 살고 있는 성인 중 임의추출한 $9n$ 명의 1인 하루 물 사용량의 표본평균을 $\overline{Y}$ 라 하자. $P(\overline{X} \leq 215) = 0.1587$ 일 때, $P(\overline{Y} \geq 235)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 물 사용량의 단위는 L이다.) [3점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.6915 ② 0.7745 ③ 0.8185
 ④ 0.8413 ⑤ 0.9772

한국교육과정평가원 · 2023학년도 대학수학능력시험 수학 확률과 통계 27번 홀수형

27. 어느 회사에서 생산하는 샴푸 1개의 용량은 정규분포

$N(m, \sigma^2)$ 을 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 16개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $746.1 \leq m \leq 755.9$ 이다.

이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 n 개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구하는 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, $b-a$ 의 값이 6 이하가 되기 위한 자연수 n 의 최솟값은? (단, 용량의 단위는 mL이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 70 ② 74 ③ 78 ④ 82 ⑤ 86

한국교육과정평가원 · 2024학년도 대학수학능력시험 수학 확률과 통계 27번 홀수형

27. 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 49인 표본을

임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq \frac{6}{5}a$ 이다. $\bar{x}$ 의 값은?

(단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 15.2 ② 15.4 ③ 15.6 ④ 15.8 ⑤ 16.0

한국교육과정평가원 · 2025학년도 대학수학능력시험 수학 확률과 통계 25번 홀수형


25. 정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 256 인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. $b-a$ 의 값은?
(단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 0.49 ② 0.52 ③ 0.55 ④ 0.58 ⑤ 0.61

한국교육과정평가원 · 2025학년도 대학수학능력시험 수학 확률과 통계 27번 홀수형

27. 숫자 1, 3, 5, 7, 9가 각각 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 3번 반복하여 확인한 세 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $V(a\bar{X}+6)=24$ 일 때, 양수 a 의 값은?
[3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



한국교육과정평가원 · 2025학년도 9월 모의평가 수학 확률과 통계 26번

26. 정규분포 $N(m, 6^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$, 정규분포 $N(6, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자. $P(\bar{X} \leq 12) + P(\bar{Y} \geq 8) = 1$ 이 되도록 하는 m 의 값은? [3점]

- ① 5 ② $\frac{13}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 11

한국교육과정평가원 · 2026학년도 대학수학능력시험 수학 확률과 통계 26번 홀수형

26. 평균이 m 이고 표준편차가 5인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $1.2 \leq m \leq a$ 이다. a 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 5.1 ② 5.2 ③ 5.3 ④ 5.4 ⑤ 5.5

한국교육과정평가원 · 2026학년도 9월 모의평가 수학 확률과 통계 26번

26. 평균이 m 이고 표준편차가 $2\sqrt{2}$ 인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 128인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균의 값이 $\bar{x}$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $\bar{x} - c \leq m \leq \bar{x} + c$ 이다. c 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 0.47 ② 0.49 ③ 0.51 ④ 0.53 ⑤ 0.55

서울특별시교육청 · 2022학년도 10월 고3 전국연합학력평가 수학 확률과 통계 23번

23. 표준편차가 12인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$ 라 할 때, $\sigma(\overline{X})$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

정답을 확인해요

2022학년도 대학수학능력시험 수학

확률과 통계 · 27번 ②

2022학년도 9월 모의평가 수학

확률과 통계 · 27번 ⑤

2023학년도 대학수학능력시험 수학

확률과 통계 · 27번 ②

2024학년도 대학수학능력시험 수학

확률과 통계 · 27번 ②

2025학년도 대학수학능력시험 수학

확률과 통계 · 25번 ① 27번 ③

2025학년도 9월 모의평가 수학

확률과 통계 · 26번 ③

2026학년도 대학수학능력시험 수학

확률과 통계 · 26번 ⑤

2026학년도 9월 모의평가 수학

확률과 통계 · 26번 ②

2022학년도 10월 고3 전국연합학력평가 수학

확률과 통계 · 23번 ②